

IL CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI STIKO

All'interno di questo volantino c'è il calendario delle vaccinazioni (vaccinazioni standard e immunizzazioni passive) per neonati, bambini, adolescenti e adulti per l'anno 2025.

L'età consigliata per la vaccinazione viene espressa in settimane, mesi e anni. Ad esempio: vaccinazione all'età di 9 – 14 anni, cioè dal 9° compleanno fino al giorno prima del 15° compleanno.

Raccomandazioni della Commissione Permanente per le Vaccinazioni (STIKO) del Robert Koch Institut 2025;
Calendario delle vaccinazioni RKI 2025: Accessibile all'indirizzo www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Informationsmaterialien/verschiedene-Sprachen/Impfkalender/Impfkalender_Deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=7
(consultato il 14.08.2025)



Questo volantino fa parte della Guida alle Vaccinazioni.
Disponibile in 17 lingue all'indirizzo:
www.schutzipfungen-mehrsprachig.de



Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

Ethno-
Medizinisches
Zentrum e.V.



Vaccinazione/ Immunizzazione passiva	Età in settimane		Età in mesi										Età in anni														
	0	6	2	3	4	5–7	8–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	> 18	60–74	> 75						
	U2/U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2									
RSV (virus respiratorio sinciziale)	Anticorpi monoclonali (dose singola) ^a						N																				
Rotaviren		G1 ^b		G2	(G3)																						
Tetano ^c			G1	N	G2	N	G3 ^d	N				A1	N	A2	N	A ^g											
Difterite ^c			G1	N	G2	N	G3 ^d	N				A1	N	A2	N	A ^g											
Pertosse ^c			G1	N	G2	N	G3 ^d	N				A1	N	A2	N	A3 ^g	N										
Hib ^c <i>H. influenzae</i> Typo b			G1	N	G2	N	G3 ^d	N																			
Poliomielite ^c			G1	N	G2	N	G3 ^d	N						A1		N											
Epatite B ^c			G1	N	G2	N	G3 ^d	N																			
Pneumococchi ^c			G1	N	G2	N	G3 ^d	N										S ⁱ									
Meningococchi B ^e			G1	N	G2	N		G3 ^e	N																		
Morbillo								G1	N	G2	N						S ^h										
Parotite, Rosolia								G1	N	G2	N																
Varicella								G1	N	G2	N																
Meningococchi C								G1	N																		
HPV (Virus del papilloma umano)																G1 ^f	G2 ^f	N									
Covid-19																			G ^j	S ^j (vaccinazione annua)							
Herpes zoster																				G1 ^k	G2 ^k	N					
Influenza																				S (vaccinazione annua)							
RSV (vaccinazione)																					S ^l						

Spiegazioni sul calendario delle vaccinazioni	
G	Immunizzazione di base (fino a 3 vaccinazioni parziali G1 – G3)
S	Vaccinazione standard
A	Richiami
N	Vaccinazione di recupero (immunizzazione di base di tutte le persone non ancora vaccinate o completamento di una serie di vaccinazioni incomplete)
U	Esame per la diagnosi precoce
J	Esame di controllo nell'adolescenza ("J1", all'età di 12 – 14 anni)
a	I neonati nati tra aprile e settembre dovrebbero ricevere l'anticorpo monoclonale in autunno, prima dell'inizio della loro prima stagione RSV; i neonati di qualsiasi età gestazionale nati durante la stagione RSV (di solito tra ottobre e marzo) dovrebbero ricevere l'anticorpo monoclonale il prima possibile dopo la nascita, idealmente al momento della dimissione dalla struttura del parto o all'U2 (3° – 10° giorno di vita).
b	La prima dose già all'età di 6 settimane; a seconda della sostanza utilizzata per il vaccino sono necessarie 2 o 3 dosi a una distanza di almeno 4 settimane.
c	Neonati prematuri: ulteriore dose di vaccino all'età di 3 mesi, per un totale di 4 dosi.
d	Distanza minima dalla dose precedente: 6 mesi
e	Secondo le informazioni specialistiche, la serie di vaccinazioni consiste in 3 dosi di vaccino per i bambini di età compresa tra 2 e 23 mesi e in 2 dosi di vaccino per i bambini di età superiore ai 24 mesi.
f	Due dosi di vaccino a distanza di almeno 5 mesi l'una dall'altra. Nel caso di vaccinazione di recupero effettuata dai 15 anni in su, o se l'intervallo tra la prima e la seconda dose della vaccinazione è inferiore a 5 mesi, è richiesta una terza dose.
g	Richiamo DT (= difterite e tetano) ogni 10 anni. Il prossimo richiamo DT deve essere fatto, per una sola volta, con vaccino combinato DTaP o, in caso di apposita indicazione, con vaccino combinato DTaP-IPV.
h	Una dose di vaccino MMR per tutte le persone nate dopo il 1970, di età pari o superiore ai 18 anni, con uno stato delle vaccinazioni non chiaro, senza vaccinazione o con una sola vaccinazione nell'infanzia.
i	Vaccinazione con un vaccino coniugato raccomandato per gli adulti.
j	Per la protezione delle persone senza patologia di base, sono necessari (almeno) 3 contatti con l'antigene, di cui almeno uno come vaccinazione.
k	Due somministrazioni del vaccino inattivato adiuvato contro l'herpes zoster a una distanza di minimo 2, massimo 6 mesi.
l	Vaccinazione singola con un vaccino RSV a base di proteine alla fine dell'estate/autunno, prima dell'inizio della stagione RSV.
*	La somministrazione dei vaccini può essere suddivisa in diversi appuntamenti. Morbillo/parotite/rosolia e varicella possono essere somministrati lo stesso giorno o a distanza di 4 settimane.

DE-NON-06392

Con il gentile sostegno di MSD



Editore:
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
(Centro di Etnomedicina)
Freundallee 25 | 30173 Hannover